



La scille à deux feuilles

Scilla bifolia



- De 10 à 25 cm
- Fleurs bleues ou roses
- Fleurs en grappe
- Tige fine
- Feuilles par paire Anthères violettes



Vous pouvez être amenés à apercevoir cette plante lors de vos balades.

Pour contribuer à l'IBC* de Cellettes, faites-le nous savoir !

Tél.: 02 54 51 56 70 Courriel: contact@cdpne.org Site internet: www.cdpne.org




De mars à mai

- Milieu boisé
- Taillis
- Milieux frais et humides

















Buglossoides purpurocaerulea



Comment le reconnaître ??>

- 20 à 60 cm
- Fleurs violettes à bleues
- Fleurs densément regroupées
- Tige velue
- Feuilles nombreuses, en pointe



Vous pouvez être amenés à apercevoir cette plante lors de vos balades.

Pour contribuer à l'IBC* de Cellettes, faites-le nous savoir !

Tél.: 02 54 51 56 70 Courriel: contact@cdpne.org

Site internet: http://www.cdpne.org/



De mai à juin

- Sous-bois clairs
- Haies
- Lisières bien ensoleillées







* Inventaire de Biodiversité Communale



L'IBC* de Cellettes a besoin de vous!



Tout d'abord, un IBC, Quézako ?

Les Inventaires de la Biodiversité Communale servent à enrichir les connaissances de votre commune avec VOTRE aide

Des affiches WANTED

sont disséminées partout dans Cellettes.

Elles mettent en lumière les espèces ANIMALES et VÉGÉTALES sous vos yeux au sein de votre commune









Lors de vos balades, vous pouvez être amenés à apercevoir ces espèces!

Faites-le nous savoir !

Tél.: 02 54 51 56 70

Courriel: contact@cdpne.org Site internet: www.cdpne.org





Le Castor d'Europe

Castor fiber



Comment le reconnaître ??>

- Longueur moyenne de 1,20 m Queue large et plate de 30 cm
- Corps brún
- Pattes complètement palmées
- Nage coulée : seuls le haut de la têté et la nuque sont visibles

Où le trouver ??

La présence du Castor d'Europe peut être observée toute l'année aux abords des cours d'eau et boisements rivulaires via la recherche de huttes ou de crayons (forme typique des ligneux taillés par le' Castor)





Vous pouvez être amenés à apercevoir des indices de présence de cette espèce lors de vos balades!

Pour contribuer à l'IBC*de Cellettes, faites-le nous savoir !

Tél.: 02 54 51 56 70 Courriel: contact@cdpne.org Site internet: www.cdpne.org





Inventaire de Biodiversité Communale


Biodiversité Communale







Rhinolophus hipposideros




Comment le reconnaître ??>

- Corps long de 4 cm
- Nez typique en forme de fer à cheval
- Brun člair sur le dos et ventre grisâtre
- Position typique de l'espèce au répos : corps complètement enveloppé de ses ailes

Où le trouver ??

Automne-hiver Vous me trouverez principalement dans les cavités souterraines (caves, sous-sols)

Avril à septembre











Pour contribuer à l'IBC de Cellettes, faites-le nous savoir !

> Tél.: 02 54 51 56 70 Courriel: contact@cdpne.org Site internet: www.cdpne.org

Inventaire de Biodiversité Communale









Salamandra salamandra

Comment la reconnaître ??>

- De 10 à 20 cm
- Noirâtre à taches jaunes
- Doigts non palmés
- Quéue cylindrique
- Allures caoutchouteuses



De février à mai

- Milieu boisé
- Mares forestières
- Flagues d'eau
- Fossés
- Ornières









Vous pouvez être amenés à apercevoir cette espèce lors de vos balades!

Pour contribuer à l'IBC* de Cellettes, faites-le nous savoir !

Tél.: 02 54 51 56 70 Courriel: contact@cdpne.org Site internet: www.cdpne.org

* Inventaire de Biodiversité Communale







Lanius collurio



- Adulte d'environ 18 cm
- Bec noir crochu
- Bandeau noir sur les yeux
- Manteau brun roux
- Ventre beige, blanc
- Queue noiré bordée de blanc



Où la trouver ??

De mai à septembre

- Prairies
- Bocage
- Friches
- Présence de buissons et d'arbustes







Vous pouvez être amenés à apercevoir cet oiseau lors de vos balades.

Pour contribuer à l'IBC* de Cellettes, faites le nous savoir !

Tél.: 02 54 51 56 70 Courriel: contact@cdpne.org

Site internet: http://www.cdpne.org/



